

## GEBRAUCHSINFORMATION

**BIOCHEMIE PFLÜGER®**

**Nr. 27 Kalium bichromicum D 6**

Homöopathisches Arzneimittel

### Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Wirkstoff:

Kalium bichromicum Trit. D 6 250,0 mg.

Sonstige Bestandteile: Calciumbehenat (DAB),  
Kartoffelstärke.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose.

Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit  
Ihrem Arzt oder Therapeuten ein, wenn Ihnen bekannt  
ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber  
bestimmten Zuckern leiden.



**Kalium  
bichromicum  
D6**

**27**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne  
Angabe einer therapeutischen Indikation.  
Bei Fortdauern der Krankheitssymptome während der An-  
wendung soll medizinischer Rat eingeholt werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Nach Anbruch bitte kühl und trocken lagern.  
Das Behältnis fest verschlossen halten.

Das Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht  
mehr anwenden!

**Reg.-Nr. 4755.55.53**

**Inhalt: 400 Stück**  
Tabletten zum Einnehmen.

05.20



Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller:  
Homöopathisches Laboratorium  
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG  
Röntgenstraße 4  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

  
**PFLÜGER**  
SCHÜBLER-SALZE



PZN -05919268

Ch.-B.:

Verwendbar bis:



**Gegenanzeigen:** Biochemie Pflüger® Nr. 27 Kalium bichromicum D 6 darf bei Chromüberempfindlichkeit nicht angewendet werden.

**Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**  
*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit berücksichtigen?*  
Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt um Rat.

**Wechselwirkungen:** keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

**Dosierung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit das Arzneimittel nicht anders verordnet wurde:

1 - 3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Die Dosierung bei Kindern erfolgt nach Anleitung eines homöopathisch erfahrenen Arztes oder Heilpraktikers.

Lassen Sie die Tablette langsam im Mund zergehen.

Bei Säuglingen und Kleinkindern sollten Sie die Tablette vor der Einnahme in etwas Wasser auflösen.

Zur Verwendung einer Individualdosierung halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Therapeuten.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:** In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend ver-

schlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Weitere erhältlich Packungsgröße:  
100 Tabletten.

Zusätzliche Darreichungsform:  
30 ml Tropfen.

Stand der Information: März 2019