

Gebrauchsanweisung

KINDERLAX®

elektrolytfrei

Macrogol 4000 (4 g) Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen in Beuteln, für Kinder von 6 Monaten bis 12 Jahren

Kinderlax elektrolytfrei ist ein Medizinprodukt zur symptomatischen Behandlung von Verstopfung bei Kindern von 6 Monaten bis 12 Jahren.



Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen, die Sie beachten sollten, bevor Sie Ihrem Kind Kinderlax elektrolytfrei verabreichen. Lassen Sie Ihr Kind immer von einem Kinderarzt untersuchen, bevor Sie dieses Produkt anwenden, um die Ursache der Verstopfung abklären zu lassen.

Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet

1. Was ist Kinderlax elektrolytfrei und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Kinderlax elektrolytfrei beachten?
3. Wie ist Kinderlax elektrolytfrei einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Kinderlax elektrolytfrei aufzubewahren und wie lange ist es haltbar?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Kinderlax elektrolytfrei und wofür wird es angewendet?

Kinderlax elektrolytfrei (Medizinprodukt) ist ein

Abführmittel für die symptomatische Behandlung von Verstopfung bei Kindern von 6 Monaten bis 12 Jahren.

Der Inhaltsstoff von Kinderlax elektrolytfrei ist Macrogol (Polyethylenglykol) 4000. Macrogol 4000 hat eine hohe Wasserbindungskapazität und dient als Transportmittel für Flüssigkeiten (Wasser). Macrogol 4000 transportiert Wasser direkt in den Dickdarm, erweicht damit den Stuhl und erleichtert auf diese Weise den Stuhlgang. Macrogol 4000 wirkt rein physikalisch im Darm, wird vom Körper nicht resorbiert und wird unverändert ausgeschieden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Kinderlax elektrolytfrei beachten?

Bevor Sie Kinderlax elektrolytfrei bei Ihrem Kind anwenden, sollten Sie die Meinung Ihres Kinderarztes einholen.

Kinderlax elektrolytfrei darf nicht eingenommen werden, wenn Ihr Kind

- überempfindlich (allergisch) gegen Macrogol ist,
- Bauchschmerzen unklarer Ursache hat,
- einen Darmverschluss (Ileus) hat oder der Verdacht auf Darmverschluss (intestinale Obstruktion) besteht,
- einen Darmdurchbruch (Perforation) hat oder die Gefahr eines Darmdurchbruchs besteht,
- unter einer schweren entzündlichen Darmerkrankung wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder unter einer Erweiterung des Dickdarms als Komplikation eines Darmgeschwürs (toxisches Megakolon) leidet.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wie bei allen Abführmitteln sollte vor der Einnahme eine organische Ursache ausgeschlossen sein. Ohne eine Kenntnis der Ursache der Verstopfung sollte Kinderlax elektrolytfrei nicht täglich über einen

längeren Zeitraum eingenommen werden. Bei anhaltenden Bauchschmerzen mit unklarer Ursache sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Wenn bei der Behandlung Durchfall auftritt, kann es zu Elektrolytstörungen kommen (z. B. bei Patienten mit Leber- und Nierenerkrankungen sowie bei der Einnahme von Diuretika). In diesem Fall muss über einen Bluttest der Elektrolytgehalt im Blut vom Arzt kontrolliert werden.

Suchen Sie sofort den Arzt oder Kinderarzt auf, wenn diese genannten Symptome oder Anzeichen für Ihr Kind zutreffen bzw. bei Ihrem Kind auftreten.

Diabetiker

Kinderlax elektrolytfrei ist zuckerfrei und kann von Diabetikern eingenommen werden.

Bei Einnahme von Kinderlax elektrolytfrei mit anderen Mitteln

Kinderlax elektrolytfrei erhöht den osmotischen Druck im Darm. Daher besteht die Möglichkeit, dass die Aufnahme von gleichzeitig eingenommenen Arzneimitteln vorübergehend verringert wird.

3. Wie ist Kinderlax elektrolytfrei einzunehmen?

Wenden Sie dieses Medizinprodukt bei Ihrem Kind immer genau nach Absprache mit dem behandelnden Arzt oder dem Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung

Es wird empfohlen, die Behandlung mit einer Dosis von 0,4 g Macrogol pro Kilogramm Körpergewicht zu beginnen. Dies entspricht 1 Beutel Kinderlax elektrolytfrei pro 10 Kilogramm Körpergewicht. Als Orientierung für die **Anfangsdosierung** kann folgende Tabelle dienen:

Alter des Kindes	Tagesdosis
6 Monate bis 1 Jahr	1 Beutel (4 g)
1 bis 4 Jahre	1 bis 2 Beutel (4 bis 8 g)
4 bis 8 Jahre	2 bis 4 Beutel (8 bis 16 g)
8 bis 12 Jahre	3 bis 8 Beutel (12 bis 32 g)

Im weiteren Therapieverlauf sollte die Tagesdosis je nach Bedarf erhöht oder erniedrigt werden, um einen regelmäßigen Stuhlgang mit weichem Stuhl zu gewährleisten.

Wenn Ihr Kind sehr weichen Stuhlgang oder Durchfall bekommt, sollten Sie die Dosis verringern. Wenn Ihr Kind mehr als einen Beutel Kinderlax elektrolytfrei pro Tag einnimmt, kann hierfür die Anzahl an Beuteln verringert werden. Wenn Ihr Kind nur einen Beutel einnimmt, sollte die Menge an Lösung, die Ihr Kind einnimmt, verringert werden.

Falls mit der Anfangsdosis (siehe Tabelle) nach 3 Tagen kein regelmäßiger Stuhlgang mit weichem Stuhl erreicht wird, kann die Dosis erhöht werden. Sprechen Sie in diesem Fall bitte zuvor mit dem behandelnden Arzt Ihres Kindes. Die maximale Tagesdosis beträgt 1 g Macrogol pro Kilogramm Körpergewicht.

Um die optimale Dosis für Ihr Kind festzulegen, kann es sinnvoll sein, ein Stuhltagebuch zu führen, in dem die Häufigkeit und die Konsistenz des Stuhls erfasst werden. Falls Sie ein solches Tagebuch führen, sollten Sie dieses bei Arztterminen immer mitnehmen, damit der Arzt die Dosierung von Kinderlax elektrolytfrei entsprechend anpassen kann.

Art der Anwendung

Kinderlax elektrolytfrei ist ein Pulver, das in Wasser aufgelöst und dann getrunken wird. Anstelle von Wasser können auch andere Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) zum Auflösen des Pulvers verwendet werden. Pro Beutel sollte dem Pulver ein Volumen von mindestens 50 ml Flüssigkeit zur Herstellung der Lösung zugesetzt werden. Rühren Sie so lange, bis

sich das Pulver vollständig aufgelöst hat und geben Sie diese Lösung Ihrem Kind zu trinken.

Es ist nicht erforderlich, die hergestellte Lösung auf einmal zu trinken. Die Lösung kann auch über den Tag verteilt eingenommen werden.

Die trinkfertige Lösung kann maximal 24 Stunden im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahrt werden.

Bitte beachten Sie

Kinderlax elektrolytfrei wirkt nach erstmaliger Einnahme in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Dauer der Anwendung

Kinderlax elektrolytfrei ist zur kurzzeitigen Anwendung bestimmt und soll nicht länger als 4 Wochen eingenommen werden. Wenn die Verstopfung weiterhin besteht, sollte ein Kinderarzt aufgesucht werden, der dann über die weitere Therapie entscheiden sollte.

Wenn Ihr Kind eine größere als die empfohlene Menge Kinderlax elektrolytfrei eingenommen hat

Bei Einnahme größerer Dosen können im verstärkten Maß Nebenwirkungen wie Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen, Übelkeit und Erbrechen auftreten, die normalerweise wieder abklingen, wenn die Behandlung unterbrochen oder die Dosis reduziert wird. Hohe Flüssigkeitsverluste können den Elektrolythaushalt stören. Wenden Sie sich bitte in einem solchen Fall an Ihren Kinderarzt!

Wenn Sie die Einnahme von Kinderlax elektrolytfrei vergessen haben

Geben Sie Ihrem Kind nicht die doppelte Dosis, sondern setzen Sie die Anwendung mit der vorgeesehenen Dosierung fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Kinderlax elektrolytfrei kann Nebenwirkungen hervorrufen, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Folgende Nebenwirkungen sind möglich:




Völlegefühl, Blähungen, vermehrte Darmgeräusche, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen (Dyspepsie), Beschwerden im Analfbereich, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. In Einzelfällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag, Juckreiz, Schwellung des Gesichts oder ernstere (anaphylaktische) Reaktionen mit Frühzeichen wie Unruhe, Atemnot, Schluck- und Sprechproblemen, Übelkeit oder Schwindel) kommen. Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen ist die Behandlung abzurechnen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Ihr Kind erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

5. Wie ist Kinderlax elektrolytfrei aufzubewahren und wie lange ist es haltbar?

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

 Sie dürfen Kinderlax elektrolytfrei nach dem auf den Beuteln angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Geöffnete oder beschädigte Beutel dürfen nicht verwendet werden.

 -25°C Nicht über 25°C lagern!

Die gebrauchsfertige Lösung kann maximal 24 Stunden im Kühlschrank ($2-8^{\circ}\text{C}$) aufbewahrt werden.

6. Weitere Informationen

Was Kinderlax elektrolytfrei enthält:

1 Beutel enthält 4 g Macrogol (PEG) 4000. Kinderlax elektrolytfrei enthält keine sonstigen Bestandteile.

Apothekenexklusives Medizinprodukt



Fairpharm Vertriebs GmbH
Am Krebsenbach 5-7
D-83670 Bad Heilbrunn

Vertrieb:

InfectoPharm
Arzneimittel und
Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
D-64646 Heppenheim



0197

Geeignet für Diabetiker: Das Pulver enthält keinen Zucker. Geeignet für Patienten, die eine natriumarme Diät einhalten müssen. Glutenfrei

Stand der Information: Januar 2017